

Ruiskutuksen teho jäänyt vajaaksi – tee täydentävä ruiskutus

Olet tehnyt jo kaksi-kolme perinteisen menetelmän rikkakasviruiskutusta tai yhden ConvisoSmart-menetelmän rikkakasviruiskutuksen ja näet rikkakasveissa oireita, mutta ne ovat edelleen hengissä tai ne ovat ”karanneet kasvuun”. Tee täydennysruiskutus nopeasti (4-5 päivän kuluttua edellisestä ruiskutuksesta). Lyhyt ruiskutusväli lisää torjunnan tehokkuutta, koska rikkakasvit eivät ole ehtineet täysin toipua aiemmasta ruiskutuksesta. Samalla saat uudet, taimettuneet rikkakasvit torjuttua niiden ollessa sirkkalehtivaiheessa.

Myös ConvisoSmart-menetelmällä täydennysruiskutus tehdään perinteisillä aineilla.

Tankkiseosreseptit rikkakasvikohtaisesti

Savikka – 4 tai useampi kasvulehti, korkeus 5-10 cm. Jos savikka on yli 15 cm korkea, suosi harausta.

	Savimaat (l/ha)	Kevyet kivennäismaat (l/ha)
Goltix/Target	1,5	1,0
Betanal	2,5	2,0-2,5
Tramat	0,4-0,5	0,3-0,35
Sunoco -öljy*	0,8-1,0	0,4-0,7

* Huomioi öljyn määrä olosuhteista riippuen.

Tattaret - Jos ruiskutuksen teho on ollut huono tattareihin (max 4 kasvulehteä), tee täydennysruiskutus 3-4 päivän päästä. Maan ollessa kostea, suositellaan Centiumin lisäämistä tankkiseokseen, jolloin teho tattareihin on maavaikutuksen kautta parempi.

Jos tattarien koko yli 5 kasvulehteä, suositellaan harausta ruiskutuksen sijaan.

	Savimaat (l/ha)	Kevyet kivennäismaat (l/ha)
Betanal	2,0-2,5	2,0
Tramat	0,4-0,5	0,3
Sunoco -öljy*	0,7-1,0	0,5-0,7
(Centium	0,05	0,05)

*Huomioi öljyn määrä olosuhteista riippuen.

Peltosaunio – 2 tai useampi kasvulehti. Matrigonia voi käyttää pesäkekäsittelynä tai riviruiskutuksena 140–165 g/ha tai Cliophar 600 SL -valmistetta 0,2 l/ha. Molempien valmisteiden kanssa käytetään esim. Sunoco-öljyä 0,5 l/ha. Peltosaunioon saadaan kiinniteöljyllä lisää tehoa, koska saunioiden lehtipinta-ala on pieni. Ruiskutus kannattaa tehdä lämpötilan ollessa korkeimmillaan ja vähintään yli +15 °C.

HUOM. Sekä Matrigonia että Cliopharia saa käyttää vain joka toinen vuosi samalla loholla. Huomioi myös jälkikasvirajoitukset klopyralidia sisältävillä valmisteilla.

	Savimaat	Kevyet kivennäismaat
Matrigon	140–165 g/ha	140 g/ha
tai Cliophar	0,2 l/ha	0,2 l/ha
Sunoco -öljy*	0,8 – 1,0 l/ha	0,4 – 0,5 l/ha

* Huomioi öljyn määrä olosuhteista riippuen.

Huom! Jos saunio on noin 10 cm korkea tai isompi, suosi harausta tai niittoa myöhemmässä vaiheessa. Jos savikka kasvaa yli juurikaskasvuston, niitto tehdään hieman naatistoa leikaten. Naatin kärjet voidaan niittää, jotta savikka saadaan jäämään naatiston alle.