

Torjunta-aineiden jälkikasvirajoitukset sokerijuurikkaalla

Toisten viljelykasvien rikkakasvien torjunnassa käytetyt valmisteet voivat aiheuttaa ongelmia sokerijuurikkaan kasvulle. Tarkista onko valmisteella rajoituksia seuraavan viljelykasvin suhteen ja ota tämä huomioon sokerijuurikkaan viljelykierrossa.

Jos tietyllä valmisteella keväällä käsitelty kasvusto joudutaan hävittämään, tarkistakaa valmisteen rajoitukset sen osalta, mitä samalle lohkolle saa kylvää ja milloin.

Tarkista aina ajantasaiset sallitut kasvinsuojeluaineet sekä niiden käyttöohjeet Kemidigistä

<https://kemidigi.fi>

Viljoilla käytetyt rikkakasvien torjunta-aineet

Ally Class 50 WG	Sokerijuurikasta saa käsitellyllä lohkolle viljellä aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua käsittelystä
CDQ SX	Sokerijuurikasta saa viljellä käsitellyllä lohkolle aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua käsittelystä.
Express Gold SX	Sokerijuurikasta saa käsitellyllä lohkolle viljellä aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua käsittelystä
Kinvara	Valmisteella käsitellyn viljelykasvin jälkeen ei saa viljellä juuri- tai mukulakasveja samalla kasvukaudella
Lancelot	Sokerijuurikasta saa käsitellyllä lohkolle viljellä aikaisintaan 14 kuukauden kuluttua käsittelystä
Mateno Duo	Sokerijuurikasta saa käsitellyllä lohkolle viljellä aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua käsittelystä
Monitor	Sokerijuurikasta ei saa viljellä käsitellyllä lohkolle seuraavana vuonna
Mustang Forte	Sokerijuurikasta saa viljellä käsitellyllä lohkolle aikaisintaan 14 kk kuluttua käsittelyn jälkeen.
Tombo	Sokerijuurikasta saa viljellä käsitellyllä lohkolle aikaisintaan 14 kk kuluttua käsittelyn jälkeen.
Tripali Maatilan Tribenuroni Trio	Sokerijuurikkaita* voidaan kylvää käsittelyä seuraavana keväänä, mikäli Tripali® käyttömäärä on edellisenä vuonna ollut enintään 35 g/ha. *Mailla jossa 50% hietaa ja pH>8, voi esiintyä kellastumista sokerijuurikkailla, syysrapsilla ja perunalla.

Rikkakasvien torjunnassa käytetty valmiste ennen taimettumista herneellä, härkäpavulla, soiapavulla, kevät- ja syysrapsilla

Conaxis	Normaalisti korjuun jälkeen voidaan kylvää kaikkia kasveja. Sokerijuurikkaan uudelleenkylvö on mahdollista 6 kuukauden odotusjakson jälkeen ilman erityisiä maan muokkaussuosituksia.
----------------	--

Rypsilä ja rapsilla käytetyt rikkakasvien torjunta-aineet

Butisan Top	Mikäli syysöljykasvit ovat tuhoutuneet talven aikana ja Butisan Top-valmistetta on käytetty syksyllä, sokerijuurikasta ei voi viljellä seuraavana keväänä.
Butisan S	Normaalisti korjatun, Butisan S:llä käsitellyn kasvuston jälkeen voidaan kylvää sokerijuurikasta. Uudelleen kylvö samana keväänä, kun Butisan S on käytetty ei saa kylvää sokerijuurikasta.
Cloud	Mikäli syysöljykasvit ovat tuhoutuneet talven aikana ja Cloud -valmistetta on käytetty syksyn aikana, sokerijuurikasta ei voi viljellä seuraavana keväänä.
Galera	Mikäli käsitelty kasvusto joudutaan hävittämään keväällä sokerijuurikasta ei voi viljellä seuraavana keväänä.
Tanaris	Tanaris tuotteella käsitellyillä pelloilla ei ole normaalin sadonkorjuun jälkeen rajoituksia seuraavan viljelykasvin valintaan. Jos kevätropsi tuhoutuu, voidaan sokerijuurikasta kylvää uudelleen ilman erityistä maan muokkausta.

Huom! CLEARFIELD (CL) kevätropsi- ja kevät- ja syysrapsi:

CLEARFIELD-öljykasvilajikkeita ei suositella samoille pelloille samaan kiertoan kuin sokerijuurikas.
Jääntikasveja ei saa helposti torjuttua millään Suomessa rekisterissä olevalla juurikkaan rikkakasviaineella.
Seuraavana vuonna rikkakasvien ja mahdollisten jääntirypsi- ja -rapsien torjuntaan tulee käyttää valmisteita, joiden tehoaineilla on erilainen vaikutustapa kuin Clamoxin ja Cleravon sisältämällä imatsamoksilla. Esimerkiksi kaikki viljojen ns. pienannosaineet ja sokerijuurikkaan Conviso One kuuluvat imatsamoksin kanssa samaan ALS-inhibiittorien ryhmään. Viljoilla tähän tarkoitukseen soveltuvat hyvin fenoksihappoja (mm. MCPA) sisältävät valmisteet ja herneellä, heinällä ja apilalla Basagran – valmisteet sekä sokerijuurikkaalla perinteiset rikkakasviaineet.

Sokerijuurikas on erityisen herkkä Clentiga- ja Cleravo-valmisteen jälkivaikutukselle, eikä niitä tule viljellä näillä valmsiteilla käsitellyn, rikotun kasvuston jälkeen edes perusteellisen maanmuokkauksen jälkeen.

Perunalla käytetyt rikkakasvien torjunta-aineet

Titus WSB Maatilan R-Sulfuroni 1	Seuraavana vuonna käsitellyllä lohkolla ei saa viljellä sokerijuurista.
Proman	Käsittelyä seuraavana vuonna voi kylvää öljykasveja, lanttua tai juurikkaita, mikäli maa on kynnetty sadonkorjuun jälkeen.

Hedelmäpuiden, marjapensaiden ja vadelmakasvustojen alustoilta, mansikkaviljelyksiltä, puuvartisten koristekasvien taimistoista ja istutuksilta rikkakasvien torjuntaan

Gallery	Käsittelyä seuraavana kasvukautena ei voi viljellä juurikasta. Sitä seuraavana kasvukautena viljelykasvien valinnassa ei ole rajoituksia.
----------------	---